



GUÍA DE EMPLEO DE GOTAS DE LECHERO AFRICANO FEVIVA

¿CÓMO SE INGIEREN LAS GOTAS?

1º paso. Golpear suavemente el gotero contra la palma de la mano.

Antes de verter las gotas, golpea el gotero suavemente contra la palma de la mano **unas 20 veces**. Esto homogeneiza la mezcla y activa los principios activos.

2º paso. Consultar la Tabla de Distribución de Gotas según su condición como paciente para saber cuántas gotas tomar.

Dependiendo de si es usted un **paciente regular, un paciente con hipertensión, diabetes o fibromialgia** compruebe más abajo en este documento su tabla de distribución de gotas para seguir su tratamiento según esta.

3º paso. Colocar las gotas debajo de la lengua.

En **TODOS LOS CASOS** las gotas se colocan bajo la lengua unos **20-30 segundos antes de ser ingeridas**. Desembocando de esta manera de inmediato en el torrente sanguíneo, lo que ayuda a su transmisión terapéutica a órganos y tejidos del cuerpo.



INDICACIONES GENERALES PARA INGERIR LAS GOTAS

Más abajo puede encontrar distintas tablas con la distribución de gotas a llevar a cabo durante su tratamiento en caso de ser un paciente regular, en caso de ser hipertenso, tener diabetes o tener fibromialgia, sin embargo, las siguientes indicaciones son **GENERALES e IMPORTANTES para TODO TIPO DE PACIENTES**:

- **Las dosis van cambiando al cuarto día** como viene indicado en la tabla de abajo.
- **Si al cambiar de dosis se presentan molestias como náuseas, regresamos a la dosis anterior durante 3 días y volvemos a incrementarla una vez pasados estos días.**
- **Entre frasco y frasco hay que realizar un descanso de tomar gotas de 10 días.**
- **Cuando se sigue con el siguiente frasco se continúa con la dosis que tomábamos anteriormente, idealmente 30 gotas para los pacientes comunes y 18 para los pacientes con diabetes.**
- **Si tiene problemas de llagas en la boca o se le irrita la lengua al ingerir las gotas, es IMPORTANTE diluir la dosis de gotas que les corresponda en ese momento con el doble de gotas de agua.** Es decir, si le corresponde tomar 7 gotas de Lechero Africano FEVIVA, colocaría estas 7 gotas junto a 14 gotas de agua en una cuchara y colocaría la mezcla debajo de la lengua por 20-30 segundos.
- **Es PRIMORDIAL ser constante con el tratamiento**, ya que la constancia es la seguridad del éxito de este.





¿CUÁNTAS GOTAS DEBO TOMAR?


CÁNCER

EN CASO DE SER USTED UN PACIENTE CON CÁNCER

- Comienza el tratamiento con 7 gotas: 3 antes del desayuno, 2 antes de comer y 2 antes de la cena, y ya después sigue con la tabla de abajo, siempre haciendo uso de las indicaciones que ya señalamos anteriormente.

| TOTAL DE GOTAS | DISTRIBUCIÓN DESAYUNO-COMIDA-CENA | PERIODO DE USO DE LA DOSIS |
|----------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 7 | 3 - 2 - 2 | 3 días |
| 10 | 4 - 3 - 3 | 3 días |
| 12 | 5 - 4 - 3 | 3 días |
| 15 | 5 - 5 - 5 | 3 días |
| 16 | 6 - 5 - 5 | 3 días |
| 18 | 6 - 6 - 6 | 3 días |
| 30 | 10 - 10 - 10 | Hasta terminar el frasco |






DIABETES

EN CASO DE SER USTED UN PACIENTE CON DIABETES

- **Comienza el tratamiento con 4 gotas:** 2 antes del desayuno, 1 antes de comer y 1 antes de la cena, y ya después sigue con la tabla de abajo, siempre haciendo uso de las indicaciones que ya señalamos anteriormente.
- **El lechero africano NO nivela los niveles de azúcar en la sangre,** como si hace la insulina, la planta ayuda a regenerar el órgano para que este actúe de una manera correcta y genere los niveles de azúcar en sangre previa a la enfermedad. Por ello, **DEBE de seguir tomando su metformina o insulina mientras la planta hace su función.**
- **Al terminar el primer frasco del Lechero Africano FEVIVA, reducir un 25% su dosis de metformina o insulina, IMPORTANTE monitorear sus niveles de azúcar en sangre, y si son los adecuados seguir con el segundo frasco de la Planta. Después repetir el proceso cada vez que termine otro frasco, el objetivo es reducir un 25% su dosis cada vez que termine un frasco hasta que deje de tomar su medicamento. Este proceso puede durar entre 7-9 meses.**

| TOTAL DE GOTAS | DISTRIBUCIÓN DESAYUNO-COMIDA-CENA | PERIODO DE USO DE LA DOSIS |
|----------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 4 | 2 - 1 - 1 | 3 días |
| 7 | 3 - 2 - 2 | 3 días |
| 10 | 4 - 3 - 3 | 3 días |
| 12 | 5 - 4 - 3 | 3 días |
| 15 | 5 - 5 - 5 | 3 días |
| 16 | 6 - 5 - 5 | 3 días |
| 18 | 6 - 6 - 6 | 3 días |





DOSIS NIÑOS 0 - 5 AÑOS CÁNCER/LEUCEMIA

| TOTAL DE GOTAS | DISTRIBUCIÓN DESAYUNO-COMIDA-CENA | PERIODO DE USO DE LA DOSIS |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Días 1 - 3 | 2 - 1 - 1 | 4 |
| Días 4 - 6 | 3 - 2 - 2 | 7 |
| Días 7 - 9 | 4 - 3 - 3 | 10 |
| Días 10 en adelante | 5 - 4 - 3 | 12 |

DOSIS NIÑOS 6 - 10 AÑOS CÁNCER/LEUCEMIA

| TOTAL DE GOTAS | DISTRIBUCIÓN DESAYUNO-COMIDA-CENA | PERIODO DE USO DE LA DOSIS |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Días 1 - 3 | 2 - 1 - 1 | 4 |
| Días 4 - 6 | 3 - 2 - 2 | 7 |
| Días 7 - 9 | 4 - 3 - 3 | 10 |
| Días 10 - 12 | 5 - 4 - 3 | 12 |
| Día 13 en adelante | 5 - 5 - 5 | 15 |

Recuerda que si hay problemas de llagas, irritación en la boca o de tener un sabor desagradable, las gotas se pueden **diluir en proporción 1:2 con agua.**



Para dudas o comentarios por favor comuníquese al
5527220095
Magali Delgado
<https://feviva.info/>

CONTACTO

Dirección:

Periférico Sur 4091, Ciudad de México, C.P. 14130.

Horarios:

Lunes a viernes de 9:00hrs a 19:00hrs.

Sábado de 9:00hrs a 14:00hrs.

Teléfono:

(+52) 56 3397 7956

Mail:

fevasocialmedia@gmail.com